

## CALCUL DIFFÉRENTIEL ET INTÉGRAL 2

Le programme se place dans le cadre de fonctions à valeurs réelles ou complexes définies sur un intervalle  $I$  de  $\mathbb{R}$ .

Il n'y a pas lieu de reprendre la présentation des concepts de dérivée et d'intégrale, et aucune difficulté théorique ne sera soulevée à ce sujet. Les interprétations géométrique et cinématique de la dérivée en un point doivent être connues.

On consolidera et on approfondira les acquis de terminale technologique sur la pratique du calcul des dérivées et des primitives.

Dans le cas de deux variables  $t$  et  $x$  liées par une relation fonctionnelle  $x = f(t)$ , on introduira la notation différentielle  $dx = f'(t)dt$  ; on admettra son interprétation graphique et on montrera l'intérêt de la différentielle pour les problèmes d'approximation. Aucune difficulté ne sera soulevée sur le statut mathématique de la notion de différentielle.

Pour l'intégration, sauf cas indispensable (pour lequel aucune difficulté théorique ne sera soulevée) on se limitera, comme en terminale technologique, au cas de fonctions dérivables.

Aucune théorie de la notion d'aire n'est au programme ; on admettra son existence et ses propriétés élémentaires.

Les exemples de calculs d'approximation cités dans le programme n'ont d'autre but que d'exercer les étudiants à mettre en œuvre, sur des exemples simples, une démarche algorithmique qui puisse être facilement interprétée graphiquement.

a) Étant donné un point  $a$  de  $I$  et une fonction  $f$  dérivable sur  $I$ .

la fonction  $x \mapsto \int_a^x f(t) dt$  est l'unique primitive de  $f$  sur  $I$

prenant la valeur zéro au point  $a$ .

Propriétés de l'intégrale :

- Relation de Chasles.
- Linéarité.
- Positivité : si  $a \leq b$  et  $f \geq 0$ , alors  $\int_a^b f(t) dt \geq 0$

intégration d'une inégalité ;

$$\text{inégalité} \quad \left| \int_a^b f(t) dt \right| \leq \int_a^b |f(t)| dt$$

inégalité de la moyenne : si  $a \leq b$  et  $m \leq f \leq M$ ,

$$\text{alors} \quad m(b-a) \leq \int_a^b f(t) dt \leq M(b-a) ;$$

de même, si  $a \leq b$  et si  $|f| \leq k$ , alors  $\int_a^b |f(t)| dt \leq k(b-a)$ .

Inégalité des accroissements finis :

$$\text{si } a \leq b \text{ et si } |f'| \leq k, \text{ alors } |f(b) - f(a)| \leq k(b-a)$$

b) Intégration par parties

c) Intégration par changement de variable

d) Illustration de l'emploi du calcul intégral pour l'obtention de majorations et d'encadrements, à l'aide d'exemples.

e) Emploi de majorations tayloriennes pour l'obtention du développement limité au voisinage de 0 de la fonction  $t \mapsto \exp t$ .

Développements limités des fonctions :  $t \mapsto \ln(1+t)$

$$t \mapsto (1+t)^\alpha \text{ où } \alpha \in \mathbb{R}, t \mapsto \sin t \text{ et } t \mapsto \cos t$$

f) Dérivée et primitives d'une fonction à valeurs complexes.

Il conviendra d'interpréter, chaque fois qu'il est possible, ces propriétés en termes d'aire.

On ne soulevra aucune difficulté théorique à propos de

l'existence de l'intégrale  $\int_a^b |f(t)| dt$

Les théorèmes d'existence (théorème de Rolle, formule des accroissements finis) et la formule de Taylor sont hors programme.

On s'appuiera sur les exemples  $t \mapsto t+b$  et  $t \mapsto at$ , où  $a$  et  $b$  sont des nombres réels, qui donnent lieu à une interprétation graphique, pour présenter sans justification théorique d'autres cas où le changement de variable est donné.

On se limitera à des exemples très simples et des indications pour l'encadrement de la fonction à intégrer devront être fournies.

Le résultat sera démontré, jusqu'à l'ordre 3

Ces résultats seront admis.

Pour ces notions, on se limitera aux fonctions  $t \mapsto e^{at}$ , avec  $a \in \mathbb{C}$ .

**Travaux pratiques**

1° Exemples d'emploi du calcul différentiel pour la recherche d'extremums, l'étude du sens de variation et le tracé des représentations graphiques des fonctions

2° Exemples de tracé de courbes planes définies par une représentation paramétrique  $x = f(t)$ ,  $y = g(t)$ .

3° Exemples simples d'emploi des développements limités pour l'étude locale des fonctions.

4° Exemples de recherche des solutions d'une équation numérique, et de mise en œuvre d'algorithmes d'approximation d'une solution à l'aide de suites.

5° Calcul d'une primitive figurant au formulaire officiel ou s'en aduisant par un changement de variable du type  $t \mapsto t + b$  et  $t \mapsto at$ .

6° Calcul d'une primitive d'une fonction rationnelle dans le cas de pôles simples.

7° Calcul d'une primitive d'une fonction exponentielle-polynôme (de la forme  $t \mapsto e^{at} P(t)$  où  $a$  est un nombre complexe et où  $P$  est un polynôme).

8° Exemples de calcul d'intégrales.

9° Exemples de calcul d'aires, de volumes, de valeurs moyennes, de valeurs efficaces.

10° Exemples de mise en œuvre d'algorithmes d'approximation d'une intégrale.

Les exemples seront issus, le plus souvent possible, de retude de phénomènes rencontrés en sciences physiques, en biologie en économie ou en technologie.

On se limitera aux situations qui se ramènent au cas des fonctions d'une seule variable.

Pour la détermination d'une fonction, on pourra être amené à résoudre un système linéaire par la méthode du pivot de Gauss. Il convient de ne pas abuser des problèmes centrés sur l'étude traditionnelle de fonctions définies par une formule donnée *a priori*, dont on demande de tracer la courbe représentative. Toute étude sur le comportement asymptotique d'une fonction devra comporter des indications sur la méthode à suivre.

On privilégiera les exemples liés aux autres enseignements (mouvement d'un point, signaux électriques, modélisation géométrique, ...). Les étudiants doivent savoir déterminer la tangente en un point où le vecteur dérivé n'est pas nul. Aucune connaissance sur l'étude des points singuliers et des branches infinies n'est exigible dans le cadre du programme de mathématiques.

Les étudiants doivent savoir utiliser, sur des exemples simples de développements limités, les opérations addition, multiplication et intégration.

Pour la composition, des indications sur la méthode à suivre devront être fournies.

Sur des exemples, on mettra en œuvre quelques méthodes classiques : dichotomie, méthode de la corde (Lagrange), méthode de la tangente (Newton). Aucune connaissance spécifique sur celles-ci n'est exigible dans le cadre du programme de mathématiques.

On pourra montrer l'intérêt d'exploiter dans le calcul intégral les propriétés des fonctions périodiques, des fonctions paires et des fonctions impaires.

Dans le cas où il y a des pôles multiples, des indications doivent être données sur la méthode à suivre.

Les étudiants devront savoir traiter les cas qui s'y ramènent simplement par linéarisation.

Tout excès de technicité est à éviter pour le calcul des primitives.

On pourra aussi, selon la spécialité, proposer des exemples de détermination de centres d'inertie et de calcul de moments d'inertie.

L'objectif est de familiariser les étudiants avec quelques méthodes élémentaires (point-milieu, trapèzes), mais aucune connaissance sur ces méthodes n'est exigible dans le cadre du programme de mathématiques.