Exercice I

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \cos 2x + 2 \sin x$.

On appelle C sa courbe représentative dans un repère orthonormal $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1° Vérifier que l'on peut réduire l'ensemble d'étude de f à l'intervalle $[0; 2\pi]$.

2° Démontrer que, pour tout réel x , $f'(x)$ est du signe de $4 \cos x \left(\frac{1}{2} - \sin x\right)$

Etudier les variations de f sur $[0; 2\pi]$ et dresser son tableau de variation.

Donner les valeurs exactes des extrema, et préciser en justifiant s'il s'agit de minima ou de maxima.

3° Démontrer que la courbe C admet la droite d'équation $x = \frac{\pi}{2}$ pour axe de symétrie.

4° Déterminer une équation de la tangente T à C au point d'abscisse 0.

Etudier la position de C par rapport à T sur $\left[0, \frac{\pi}{6}\right]$

5° On a tracé ci-contre, dans un repère orthonormal, la courbe C sur $[0; 2\pi]$. (l'unité graphique n'est pas précisée) En utilisant les questions précédentes compléter le tracé sur $[-\pi, 2\pi]$ et tracer la droite T

Exercice II Soit la fonction f définie sur $]1, +\infty[$ par $f(x) = \frac{x^3 + 2x^2}{x^2 - 1}$ et C sa représentation graphique

dans le plan muni d'un repère orthonormal $(O; \vec{i}, \vec{j})$ (unité graphique 2 cm).

Le but du problème est l'étude de la fonction f .

Partie A Etude d'une fonction auxiliaire

Soit la fonction g définie sur $]1, +\infty[$ par : $g(x) = x^3 - 3x - 4$.

1° Etudier les variations de la fonction g .

2° Montrer qu'il existe un réel α unique dans l'intervalle $[2, 3]$ tel que $g(\alpha) = 0$.

3° Dédire des questions précédente le signe de $g(x)$ sur $]1, +\infty[$

Partie B Etude de la fonction f

1° Déterminer les limites de la fonction f en 1

2° Démontrer que pour tout x de $]1, +\infty[$: $f'(x) = \frac{x \cdot g(x)}{(x^2 - 1)^2}$. En déduire le tableau de variation de f

3° a) Démontrer que pour tout x de $]1, +\infty[$: $f(x) = x + 2 + \frac{x+2}{x^2-1}$.

b) En déduire que C admet une asymptote oblique D en $+\infty$.

4° Tracer la courbe C et la droite D (On admettra que $\alpha \approx 2,2$ et que $f(\alpha) \approx 5,3$)

Exercice III

1° Déterminer le module et un argument de chacun des nombres complexes donnés :

$a = -1 + i$	$b = 1 - i\sqrt{3}$	$c = \frac{1}{2}$	$d = -3i$	$e = \sqrt{6} + i\sqrt{2}$
--------------	---------------------	-------------------	-----------	----------------------------

2° Déterminer la forme algébrique de chacun des nombres complexes suivants

$A = a^3 = (-1 + i)^3$	$B = \frac{a}{b} = \frac{-1 + i}{1 - i\sqrt{3}}$	$C = \left(\frac{a}{b}\right)^6 = \left(\frac{-1 + i}{1 - i\sqrt{3}}\right)^6$
------------------------	--	--

3° Les points A, B, C ont pour affixes: $z_A = a = -1 + i$, $z_B = b = 1 - i\sqrt{3}$ et $z_C = c = \frac{1}{2}$.

Quelle particularité présente le triangle ABC ?

4° Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation : $3z^3 - 5z^2 + 3z - 4 = 0$.

Ex I

1° f est périodique de période 2π

2° $f'(x) = -2 \sin 2x + 2 \cos x$

$$= -4 \sin x \cos x + 2 \cos x$$

$$= 4 \cos x \left(-\sin x + \frac{1}{2} \right)$$

-3 minimum, $\frac{3}{2}$ maximum,

1 minimum local

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{6}$	$\frac{3\pi}{2}$	2π
cos x	+	+	0 -	+	0 -	
$\frac{1}{2} - \sin x$	+	0 -	-	0 +	+	
f'(x)	+	0 -	0 +	0 -	0 +	
f	1	$\frac{3}{2}$	1	$\frac{3}{2}$	-3	1

$$3^\circ f\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \cos(\pi + 2x) + 2 \sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = -\cos 2x + 2 \cos x$$

$$f\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos(\pi - 2x) + 2 \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = -\cos 2x + 2 \cos x$$

4° $f(0) = 1$ et $f'(x) = 2$.

Equation de la tangente : $y = 2x + 1$

$$g(x) = f(x) - (2x + 1) = \cos 2x + 2 \sin x - 2x - 1.$$

$$g'(x) = -2 \sin 2x + 2 \cos x - 2.$$

$$0 \leq x \leq \frac{\pi}{6} \text{ donc } 0 \leq \sin 2x \leq \frac{\sqrt{3}}{2} \text{ et } 0 \leq \cos x \leq \frac{1}{2}.$$

$$\text{On a donc } -2 \times \frac{\sqrt{3}}{2} + 2 \times 0 - 2 \leq g'(x) \leq -2 \times 0 + 2 \times \frac{1}{2} - 2$$

c'est-à-dire $-\sqrt{3} - 2 \leq g'(x) \leq -1 < 0$. g est donc décroissante sur $\left[0, \frac{\pi}{6}\right]$

pour tout réel x de $\left[0, \frac{\pi}{6}\right]$ on a : $g(x) \leq 0$ ($g(0) = 0$) donc C_f est au dessous de T

ex II A 1° $g'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x^2 - 1) > 1$ sur $]1, +\infty[$. g est croissante sur $]1, +\infty[$.

2° g dérivable et strictement croissante sur $]1, +\infty[$,

$g(2) < 0 < g(3)$ donc l'équation $g(x) = 0$ admet une solution et une seule dans $[2, 3]$.

3° D'après les variations de g si $x < \alpha$ alors $g(x) < 0$

et si $x > \alpha$ alors $g(x) > 0$ ($g(\alpha) = 0$)

B 1° $\lim_{x \rightarrow 1^+} x^2 - 1 = 0^+$ et $\lim_{x \rightarrow 1^+} x^3 + 2x^2 = 3$

donc $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty$

$$2^\circ f'(x) = \frac{(3x^2 + 4x)(x^2 - 1) - (x^3 + 2x^2)(2x)}{(x^2 - 1)^2}.$$

sur $]1, +\infty[$ $f'(x)$ est du signe de $g(x)$

$$3^\circ \text{ a) } x + 2 + \frac{x + 2}{x^2 - 1} = \frac{(x + 2)(x^2 - 1) + x + 2}{x^2 - 1} = f(x).$$

b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + 2}{x^2 - 1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{x^2} = 0$ Donc T est bien asymptote à C_f

x	1	α	$+\infty$
signe de f'(x)	-	0	+
f	$+\infty$	$f(\alpha)$	$+\infty$

Ex III 1°

$a = -1 + i$ $= \left[\sqrt{2}, \frac{3\pi}{4} \right]$	$b = 1 - i\sqrt{3}$ $= \left[2, -\frac{\pi}{3} \right]$	$c = \frac{1}{2} = \left[\frac{1}{2}, 0 \right]$	$d = -3i$ $= \left[3, -\frac{\pi}{2} \right]$	$e = \sqrt{6} + i\sqrt{2}$ $= \left[2\sqrt{2}, \frac{\pi}{6} \right]$
---	---	---	---	---

2° $A = a^3 = (-1 + i)^3$

$$A = a^3 = \left[(\sqrt{2})^3, 3 \frac{3\pi}{4} \right] = \left[2\sqrt{2}, \frac{\pi}{4} \right] = 2 + 2i$$

$$A = (-1)^3 + 3 \times (-1)^2 \times i + 3 \times (-1) \times i^2 + i^3 = -1 + 3i - 3 + i = -4 + 4i$$

$$B = \frac{a}{b} = \frac{-1 + i}{1 - i\sqrt{3}} = \frac{(-1 + i)(1 + i\sqrt{3})}{1 - 3} = \frac{-\sqrt{3} - 1}{4} + i \frac{-\sqrt{3} + 1}{4}$$

$$C = \left(\frac{a}{b} \right)^6 = \left(\frac{-1 + i}{1 - i\sqrt{3}} \right)^6 = \frac{a^6}{b^6}$$

$$a^6 = \left[(\sqrt{2})^6, 6 \frac{3\pi}{4} \right] = \left[8, \frac{9\pi}{2} \right] = -8i \text{ et}$$

$$b^6 = \left[2^6, -\frac{\pi}{3} \times 6 \right] = [64, -2\pi] = 64$$

Donc $C = -\frac{i}{8}$

$$3^\circ AB = |b - a| = |2 - (\sqrt{3} + 1)i| = \sqrt{2(\sqrt{3} + 4)}$$

$$AC = |c - a| = \left| \frac{3}{2} - i \right| = \frac{\sqrt{13}}{2}$$

$$BC = |c - b| = \left| -\frac{1}{2} + i\sqrt{3} \right| = \frac{\sqrt{13}}{2}$$

ABC est isocèle en C.

4° 1 est racine évidente de l'équation : $3z^3 - 5z^2 + 6z - 4 = 0$

Donc $3z^3 - 5z^2 + 6z - 4 = (z - 1)(3z^2 - 2z + 4)$.

Equation $3z^2 - 2z + 4 = 0$.

$$\Delta = 4 - 4 \times 4 \times 3 = -44 = (2i\sqrt{11})^2$$

deux solutions $\frac{1 + i\sqrt{11}}{3}$ et $\frac{1 - i\sqrt{11}}{3}$.

l'équation $3z^3 - 5z^2 + 6z - 4 = 0$ admet donc trois solutions $1, \frac{1 + i\sqrt{11}}{3}$ et $\frac{1 - i\sqrt{11}}{3}$.